

Het klinisch spectrum van orthostatische tremor


Milou Meulepas

Klinisch spectrum

- Patiëntkarakteristieken
- Klachtenpatroon
- Manier van diagnose stellen
- Ernst van de tremor
- Medicijn gebruik

Patiëntkarakteristieken


- 22 enquêtes ingevuld
- 5 mannen, 17 vrouwen
- 2 patiënten ook andere neurologische aandoening
- Voorkomen OT in familie:
 - 1 OT in familie, 1 waarschijnlijk OT in familie
 - 1 tremor in familie



■ Male

■ Female

Age diagnosed with OT



Klachtenpatroon

- Begin van de klachten: 50 jaar (25-72)
- Leeftijd van diagnose: 61 jaar
- Gemiddelde vertraging: 9 jaar (0-29)

Manier van diagnose stellen

- Kliniek (verhaal + lichamelijk onderzoek)
 - 77% gebruikt
- Stethoscoop (helikopter geluid)
 - 72% gebruikt
- Spiermeting (EMG)
 - 72% gebruikt
- Meestal alle drie de methoden (45%)

Ernst van de tremor

- Ernst:
 - 72% veel last
 - 9% enige beperkingen/ veel last
 - 18% enige beperkingen
- Tremor armen/ andere lichaamsdelen
 - Ja: 77%
 - Soms: 9%
 - Nee: 14%
- Tremor in rust: 36%

Medicijn gebruik

- 45 % gebruikt medicatie (10 personen)
- 27% heeft medicatie gebruikt (6 personen)
- Clonazepam meest voorgeschreven
- 62 % Medicatie helpt een beetje

Conclusie

- Meer vrouwen dan mannen
- Vaak lange tijd voor diagnose
- OT geeft voor de meeste patiënten veel last
- Vaak ook een tremor in armen/andere lichaamsdelen
- Nog geen medicatie die goed helpt,
Clonazepam wordt het meest geprobeerd